

目標:リハビリにより生活に必要な機能を獲得する

病院

患者氏名 ID
おきなわ津梁ネットワーク登録
生年月日 年 月 日 年齢 性別 男性 女性

エンドポイント
帰来先
死亡
自宅
在宅系施設
介護老人保健施設
回復期病院
療養病床
その他
パスの状態
パス適用外
死亡
退院 (通院・通所・訪問リハ)
パス継続
回復期病院
維持期

発症日 年 月 日
起算日 年 月 日
入院日 年 月 日
退院日 年 月 日
在院日数
身障手帳 あり なし 不明
介護保険
確定 申請中 なし 不明
発症前の生活状況
自立 半介助 全介助
家族構成 (キーパーソン:)
キーパーソン あり なし
同居家族 あり なし
身寄り あり なし
MSW

主な疾患
脳梗塞
脳出血
くも膜下出血
急性期治療
血管内治療
手術、その他
ラクナ梗塞
アテローム血栓症
脳塞栓症
脳動静脈奇形
水頭症併発
抗血小板療法
抗凝固療法
経口抗血小板療法
経口抗凝固療法
エダラポン
t-PA療法

認知度 (日常生活自立度) 正常
I IIa IIb IIIa IIIb IV M

既往歴
リスク因子
高血圧 (未治療)
脂質異常症 (未治療)
糖尿病 (未治療)
脳卒中の既往
虚血性心疾患の既往
不整脈
CKD (慢性腎病変)
喫煙
肥満
その他

ADL評価
入院前ADL: ()
入院後ADL:
FIM 点 (運動 点 / 認知 点)
評価日 (月 日)

食事・栄養
嚥下障害
食事ポジション
常食
制限食 (Kcal 塩分 g)
水分摂取
形態制限
経管栄養 (品名: ml x 回 水 ml x 回)

身体機能
利き手
麻痺: Brunnstrom Stage
小脳失調
その他運動障害
構音障害
嚥下障害
感覚障害
高次脳機能障害
意識障害
認知症

日常生活機能評価表 (ADL) : 合計点 (0~19点) [] 点
0点 1点 2点
床安静指示
どちらかの手を胸元まで持ち上げられる
寝返り
起き上がり
座位保持
移乗
移乗方法
口腔清潔
食事摂取
衣服の着脱
他者への意思伝達
診療療養上の指示が通じる
危険行動

問題行動
幻視・幻聴
暴力
不眠
徘徊
危険行為
不潔行動
異食行動
その他

主治医記入
リハビリ記入
看護師記入
MSW記入

医師
リハスタッフ
PT
OT
MSW
ST